

บันทึกข้อความ วันที่

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยผู้ป่วยชื่อ.....HN.....

ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง

(CAPD) ที่โรงพยาบาล.....

ขณะนี้มีปัญหาติดเชื้อในช่องท้อง(PD related peritonitis) จำเป็นต้องผสมยาปฏิชีวนะ

ลงในน้ำยาล้างไตทางช่องท้องทุกวัน เป็นเวลา.....วันตั้งแต่วันที่.....

..... ถึงวันที่ซึ่งผู้ป่วยไม่สะดวกที่

จะเดินทางไปโรงพยาบาลต้นสังกัด

จึงขอความร่วมมือจากท่านซึ่งเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านผู้ป่วย ช่วยผสมยาปฏิชีวนะลงในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ตามขั้นตอนดังเอกสารที่แนบมาดังนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(_____)

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่คุณ.....


โทร เวลา.....

ขั้นตอนการผสมยาปฏิชีวนะลงในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

A.เตรียมสถานที่และยาปฏิชีวนะที่จะผสมยาในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ห้อง น้ำยา บริษัท Fresenius

1. ปิดประตู หน้าต่าง ปิดพัดลมเซ็ดไ้ะสำหรับเตรียมน้ำยาล้างไตฯ ให้สะอาด เซ็ดไ้ะด้วย 70% alcohol
2. ผู้ปฏิบัติ ผูก mask ปิดปากและจมูกล้างมือ ตามขั้นตอน
3. เตรียมยาปฏิชีวนะที่จะฉีดเข้าน้ำยาตามแผนการรักษาและเปลี่ยนหัวเข็มของหลอดฉีดยาที่ผสมยาปฏิชีวนะที่เตรียมไว้เป็นเบอร์ 24 เพื่อเตรียมฉีดเข้าที่ injection port

****การฉีดยาเข้าในแต่ละถุงต้องเปลี่ยนหัวเข็มทุกครั้ง****



B. ขั้นตอนการผสมยาปฏิชีวนะลงในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

Fresenius

1. นำน้ำยาล้างไต ที่จะผสมยาวางบนโต๊ะ 3 ถุง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของน้ำยา ปริมาตร เปอร์เซ็นต์ วันหมดอายุ รอยรั่วของถุงน้ำยา





3. ใช้ 70% alcohol เช็ดกรรไกร และถุงด้านนอกบริเวณ injection port แล้วใช้กรรไกรที่เช็ดด้วย 70% alcohol แล้วตัดถุงเพียงเล็กน้อยให้กว้างพอที่จะดึง injection port ออกมาได้

****ห้ามฉีกถุงน้ำยาขาดเด็ดขาดเพราะจะถือว่าเกิดการปนเปื้อนไม่ให้นำไปใช้****



4. ดึง injection port ออกมาจากถุงและเช็ดด้วย 70% alcohol รอจนแห้ง
 5. นำยาปฏิชีวนะที่เตรียมไว้ ฉีดเข้าที่ injection port
- **ระวังอย่าให้เข็มแทงถุงน้ำยารั่ว****



6. หลังจากผสมยาปฏิชีวนะในน้ำยาเสร็จแล้ว ให้เช็ด injection port ด้วย 70% alcohol แล้วดัน port กลับเข้าถุงตามเดิม
7. ปิดปากถุงชั้นนอกบริเวณที่ใช้กรรไกรตัดให้สนิทด้วยพลาสติก และเขย่าถุงน้ำยาให้ยา
8. เขียนชื่อและขนาดยาปฏิชีวนะ, วันและเวลาที่จะใช้น้ำยาไว้ที่ถุงเพื่อให้รู้ว่าผสมยาปฏิชีวนะแล้ว รวมทั้งควรลงชื่อผู้ผสมยาปฏิชีวนะไว้ที่ถุงชั้นนอก



การเก็บน้ำยาที่ผสมแล้ว

1. น้ำยาที่จะใช้วันนี้ให้เก็บในอุณหภูมิห้อง
2. อีก 2 ถุงที่ใช้ในครั้งต่อไป ให้แช่ในตู้เย็น ช่องเย็นปกติ
3. ก่อนนำน้ำยาที่ผสมยาปฏิชีวนะออกมาใช้ ให้เอาน้ำยาออกจากตู้เย็น วางไว้ให้หายเย็นก่อนใช้ทุกครั้ง